

Defensor™ 3 Rabies Vaccine Killed Virus ตีพีเอ็นเซอร์ 3



ใช้สำหรับสุนัข แมว โค-กระบือ และแกะเท่านั้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Each dose (1 ml) contains : Inactivated Rabies Virus, PV-Paris, SVR-289 Str. Min $10^{7.35}$ FAID₅₀ (pre-Inactivation) "Defensor 3" เป็นวัคซีนที่ใช้ฉีดให้กับสุนัข แมว โค-กระบือ และแกะที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนนี้เตรียมขึ้นจากเชื้อไวรัสที่เจริญอยู่ใน cell culture และถูกทำให้หมดฤทธิ์ด้วยสารเคมี seed ของไวรัสที่นำมาผลิตเป็นชนิดที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้และเป็นชนิดเดียวกับที่แยกได้โดย Louis Pasteur ในปี คศ.1882 เชื้อไวรัสที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์แล้วจะผสมอยู่กับสื่อและบรรจุในรูปของเหลว

ข้อบ่งใช้

สำหรับสุนัขและแมว

วิธีใช้โดยทั่วไป : เขย่าวัคซีนให้เข้ากันก่อนใช้ทุกครั้ง ดูวัคซีนจำนวน 1 มล. ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังสำหรับสุนัขและแมว หรืออาจฉีดเข้ากล้ามเนื้อในสุนัข

การฉีดวัคซีนครั้งแรก : ให้ฉีดวัคซีนจำนวน 1 มล. ให้กับสุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และควรฉีดซ้ำหลังจากฉีดวัคซีนครั้งแรกครบ 1 ปี

การฉีดวัคซีนซ้ำ : ควรฉีดวัคซีนซ้ำทุกปี

สำหรับโค-กระบือและแกะ

วิธีใช้โดยทั่วไป : เขย่าวัคซีนให้เข้ากัน ดูวัคซีนจำนวน 2 มล. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

การฉีดวัคซีนครั้งแรก : ให้ฉีดวัคซีนครั้งแรกจำนวน 2 มล. ให้กับโค-กระบือ และแกะที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนหรือมากกว่า และควรฉีดซ้ำหลังจากฉีดวัคซีนครั้งแรกครบ 1 ปี

การฉีดวัคซีนซ้ำ : ควรฉีดวัคซีนซ้ำทุกปี

ข้อควรระวัง

- เก็บวัคซีนที่อุณหภูมิ 2 – 7 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง
- ใช้วัคซีนให้หมดในครั้งเดียวหลังจากเปิดใช้แล้ว
- ห้ามฉีดวัคซีนก่อนฆ่าสัตว์เพื่อบริโภคอย่างน้อย 21 วัน
- ใช้ Gentamicin เป็นตัวเก็บรักษาวัคซีน
- ในกรณีที่แพ้วัคซีนให้แก้ไขด้วยการฉีด epinephrine
- วัคซีนจะให้ผลดีเมื่อใช้กับสัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ การไม่ตอบสนองต่อวัคซีนอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่สัตว์นั้น ได้รับเชื้อมาก่อน ขาดอาหาร มีพยาธิ หรือเกิดความเครียดเนื่องจากการขนส่งจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้วัคซีนที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ใช้โดยสัตวแพทย์ปริญญาเท่านั้น